

Aktuellt i stärkelsepotatisfälten

Sättningen har blivit något mer utdragen än normalt på grund av mycket nederbörd vilket bidrar till stor spridning mellan fälts utvecklingsstadie.

I tidigt satta fält börjar vi närma oss en andra ogräsbekämpning och vi ska nu se till att få bra effekt mot eventuell snärjmåra, gräsogräs och kanske främst nattskatta.

Snärjmåra bekämpas med 30-35 gram Titus + 0,1 vätmedel/100 l vatten. Snärjmåran bör ha 2-4 kransar. Även 3-4 l Boxer/Roxy har god effekt mot snärjmåra, men är fältet fritt från nattskatta är en Titus-behandling billigare.

Målla och åkerbinda i fältet ska antingen Titus-behandlingen delas (30+20 gram/ha) eller köras som engångsbehandling 50 gram/ha. Hög förekomst eller stora ogräsplantor (3 blad) bör Titus tankblandas med 0,1-0,2 Sencor WG/ha. Det finns risk för brännskador på potatisen och behandlingen kan behöva kompletteras med en kupning 7-10 dagar senare. Tänk på att Titus enbart är godkänt **från då plantan fått sidoskott och tills 10 % radtäckning (stadie 20-30) Sencor är godkänt fram tills stadie 20.**

Nattskatta bekämpas efter uppkomst med 3 l Boxer eller Roxy. Viktigt med torra blad och god markfukt för att undvika behandlingsskador. **Bekämpa nattskattan i hjärtbladsstadie (2 blad)**, plantor som hunnit få 3 blad är svårbekämpade och en komplettering med kupning ca 2 v efter behandling blir då oftast aktuell. **Boxer/Roxy är endast tillåten fram tills stadie 11, vilket uppnås när första bladet når en storlek på över 4 cm. 10 m skyddsavstånd mot vattendrag.** Boxer/Roxy-körningen kan kompletteras med 0,1-0,15 Sencor WG mot målla och åkerbinda.

Tistel är svårbekämpad, full dos Titus har måttlig effekt.

Gräsogräs så som kvickrot bekämpas vid 2-4 blad med 50 gram Titus. Det kan i extrema fall bli aktuellt med delad behandling om gräsogräsens uppkomst och utveckling är ojämn. Stora mängder kvickrot eller kompletterande behandlingar kan även bekämpas med 2-3 l Focus Ultra eller 0,75-1 l Select + lika mängd Renol. Select har även god effekt mot vitgröe.

Läs alltid etiketten före användning!

Mangan bör tillsättas på lätta jordar. Exempelvis 0,5-1 l Mangannitrat.

Det har hittats **potatisbladmögel** på en handfull platser i Skåne i odlingar som varit under väv i Båstad- och Ystad-trakten, ingen bladmögel rapporterad från Danmark. Håll koll i era fält, främst där potatisodlingen är intensiv. Klimatet har varit gynnsamt för infektion under maj månad i stora delar av odlingsområdet.

Hälsningar
Henrik Knutsson
044-28 61 55

Lyckeby Starch AB
Degebergavägen 60-
20
SE-291 91 Kristianstad
SWEDEN

Tel: +46 (0)44 28 61 00
medlem@lyckeby.com
www.lyckeby.com

Faktura/Invoicing
address
PO Box 45
SE-290 34 Fjälkinge
SWEDEN

Reg. nr/F-skatt/VAT
5560835497
SE 556083549701

