

Odlarbrev vecka 29

- Aktuellt i fält
- Insektsbevakning
- Bladmögel
- Alternaria
- Bladskafsanalyser

Aktuellt i fält

Denna vecka ser det ut att bladmögeltrycket är något lägre kopplat till några dagar med varmt och torrt väder. Det är fortsatt av stor vikt att kontrollera era fält och vår uppmaning är att fortsatt hålla ett behandlingsintervall på **sju dagar**. Vi ser fortsatt en hög tillväxt i många fält och med ett veckointervall på bekämpningarna så skyddas nytillväxten på ett bra sätt. Glöm inte tillsätta mangan under hela juli månad.

Insektsbevakning

Stritar

Generellt lite stritar, inget bekämpningsbehov just nu.

Löss

Vi hittar mycket löss i en flera fält så fortsatt kontrollera era fält!

Bekämpningströskel: 10 bladlöss per storblad (7-9 småblad)

Bekämpningsrekommendation: **0,16 Teppeki** (endast effekt på bladlöss)

Bladmögel

Fortsätt hålla ett sjudagarsintervall på bekämpningarna.

Den generella rekommendationen denna vecka är att köra 50-75 % dos av Ranman top.

Bekämpningsrekommendation:			
Vecka 29	Full dos	75 % dos	50 % dos
Ranman top	0,50 l	0,38 l	0,25 l

Alternaria

Vår generella rekommendation är att starta alternariabehandlingen ca 6-8 veckor efter uppkomst, vilket i praktiken hamnar kring den 10-15 juli.

Kördes ingen alternariabehandling förra veckan så är det dags denna vecka, se odlarbrev för vecka 28 för mer information.

Räkna med att en behandling mot Alternaria räcker i ca 14 dagar.

