

Odlarbrev vecka 23

- Aktuellt i fält
- Ogräsbekämpning – uppföljande behandling
- Bladmögel
- Bevattning
- Insektsbevakning
- Fältvandringar

Aktuellt i fält

Det torra och nederbördsfattiga vädret fortsätter och inget regn syns i prognosen framåt heller. Ett starkt högtryck över brittiska öarna ligger och håller emot lågtryck som istället drar in över norra Skandinavien.

Varmt väder gynnar insekterna och vi ser en ökning av inflygningen av stritar på en del platser. Prioritera bevattning i potatisen där plantorna nått krokstadiet.

Ogräsbekämpning – uppföljande behandling

För fält som närmar sig en planhöjd på 15-20 cm så är det dags att utföra en kompletterande ogräsbehandling.

För att få bra effekt av den andra ogräsbekämpningen ska **tidpunkten tajmas efter ogräsens stadium, inte potatisens**. Observera att en del jordherbicer tar tid på sig och att effekter först ses när örtbladen kommer fram.

Ett alternativ är att behandla ogräsen mekaniskt, med radrensare eller kupare.

Om det finns nattskatta eller stora besvärliga ogräs kan detta vara ett både bättre och billigare alternativ än att behandla kemiskt, en kombination är också ett alternativ.

Observera dock att kupning bör ske när plantorna är max. 15-20 cm höga. Vid större plantor kan kupning ge skördesänkning.

Preparatval till andra ogräsbekämpningen

Titus har en bred ogräseffekt – men kan behöva blandas med Sencor om målla och åkerbinda fått fler än 3 blad. Titus har ingen effekt på nattskatta. Glöm inte tillsätta vätmedel till Titus då vi i försök har sett radikal effektförsämring utan vätmedel

Alternativ 1: Titus 30-50 g + vätm.

Alternativ 2: Sencor SC 600 0,23 + Titus 30-50 g + vätm. (om åkerbinda och/eller målla fått fler än 3 blad)

Se mer ingående information kring strategier i ogräsbrevet:

<https://www.lyckeby.com/wp-content/uploads/2023/05/ograsrekommendationer-2023.pdf>

Bladmögel

Fynd av bladmögel har gjorts i färskpotatis på Bjäre. Enligt Skimmelstyring har vi just nu ett lågt tryck av bladmögel kopplat till det torra vädret i vårt odlingsområde.

Årets bladmögelbrev med strategier för året kommer i slutet på denna vecka.

Länk till Skimmelstyring:

<https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SkimmelstyringSE.aspx?id=10485>

Bevattning



Prioritera bevattning i de fält som nått **krokstadiet**. Det är nu anlagen till knölna bildas och välvattnade fält ge större möjlighet till hög knölsättning. Ett av våra bevattningsförsök visar att bevattning vid krokstadiet gynnar knölsättningen men den stora skördepåverkan får man med bevattning under knöltillväxten i juli-augusti månad.


Insektsbevakning

Stritar

Dagens avläsning visar på lågt antal stritar i fällorna i nuläget, med en svag ökning på någon enskild plats.

Bekämpning ska ske en vecka efter inflygningstopp alternativt två veckor efter begynnande inflygning.

Bekämpningsrekommendation: inget bekämpningsbehov denna vecka.



Fältvandringar

Vi planerar att arrangera ett antal fältvandringar i sommar. Mer info om dessa kommer i ett separat utskick inom kort!

Hälsningar
Stefan Hansson
stefan.hansson@lyckeby.com
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Odlarbrev vecka 23

- Aktuellt i fält
- Ogräsbekämpning – uppföljande behandling
- Bladmögel
- Bevattning
- Insektsbevakning
- Fältvandringar

Aktuellt i fält

Det torra och nederbördsfattiga vädret fortsätter och inget regn syns i prognosen framåt heller. Ett starkt högtryck över brittiska öarna ligger och håller emot lågtryck som istället drar in över norra Skandinavien.

Varmt väder gynnar insekterna och vi ser en ökning av inflygningen av stritar på en del platser. Prioritera bevattning i potatisen där plantorna nått krokstadiet.

Ogräsbekämpning – uppföljande behandling

För fält som närmar sig en planhöjd på 15-20 cm så är det dags att utföra en kompletterande ogräsbehandling.

För att få bra effekt av den andra ogräsbekämpningen ska **tidpunkten tajmas efter ogräsens stadium, inte potatisens**. Observera att en del jordherbicer tar tid på sig och att effekter först ses när örtbladen kommer fram.

Ett alternativ är att behandla ogräsen mekaniskt, med radrensare eller kupare.

Om det finns nattskatta eller stora besvärliga ogräs kan detta vara ett både bättre och billigare alternativ än att behandla kemiskt, en kombination är också ett alternativ.

Observera dock att kupning bör ske när plantorna är max. 15-20 cm höga. Vid större plantor kan kupning ge skördesänkning.

Preparatval till andra ogräsbekämpningen

Titus har en bred ogräseffekt – men kan behöva blandas med Sencor om målla och åkerbinda fått fler än 3 blad. Titus har ingen effekt på nattskatta. Glöm inte tillsätta vätmedel till Titus då vi i försök har sett radikal effektförsämring utan vätmedel

Alternativ 1: Titus 30-50 g + vätm.

Alternativ 2: Sencor SC 600 0,23 + Titus 30-50 g + vätm. (om åkerbinda och/eller målla fått fler än 3 blad)

Se mer ingående information kring strategier i ogräsbrevet:

<https://www.lyckeby.com/wp-content/uploads/2023/05/ograsrekommendationer-2023.pdf>

Bladmögel

Fynd av bladmögel har gjorts i färskpotatis på Bjäre. Enligt Skimmelstyring har vi just nu ett lågt tryck av bladmögel kopplat till det torra vädret i vårt odlingsområde.

Årets bladmögelbrev med strategier för året kommer i slutet på denna vecka.

Länk till Skimmelstyring:

<https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SkimmelstyringSE.aspx?id=10485>

Bevattning



Prioritera bevattning i de fält som nått **krokstadiet**. Det är nu anlagen till knölarna bildas och välvattnade fält ge större möjlighet till hög knölsättning. Ett av våra bevattningsförsök visar att bevattning vid krokstadiet gynnar knölsättningen men den stora skördepåverkan får man med bevattning under knöltillväxten i juli-augusti månad.


Insektsbevakning

Stritar

Dagens avläsning visar på lågt antal stritar i fällorna i nuläget, med en svag ökning på någon enskild plats.

Bekämpning ska ske en vecka efter inflygningstopp alternativt två veckor efter begynnande inflygning.

Bekämpningsrekommendation: inget bekämpningsbehov denna vecka.



Fältvandringar

Vi planerar att arrangera ett antal fältvandringar i sommar. Mer info om dessa kommer i ett separat utskick inom kort!

Hälsningar
Stefan Hansson
stefan.hansson@lyckeby.com
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Odlarbrev vecka 23

- Aktuellt i fält
- Ogräsbekämpning – uppföljande behandling
- Bladmögel
- Bevattning
- Insektsbevakning
- Fältvandringar

Aktuellt i fält

Det torra och nederbördsfattiga vädret fortsätter och inget regn syns i prognosen framåt heller. Ett starkt högtryck över brittiska öarna ligger och håller emot lågtryck som istället drar in över norra Skandinavien.

Varmt väder gynnar insekterna och vi ser en ökning av inflygningen av stritar på en del platser. Prioritera bevattning i potatisen där plantorna nått krokstadiet.

Ogräsbekämpning – uppföljande behandling

För fält som närmar sig en planhöjd på 15-20 cm så är det dags att utföra en kompletterande ogräsbehandling.

För att få bra effekt av den andra ogräsbekämpningen ska **tidpunkten tajmas efter ogräsens stadium, inte potatisens**. Observera att en del jordherbicer tar tid på sig och att effekter först ses när örtbladen kommer fram.

Ett alternativ är att behandla ogräsen mekaniskt, med radrensare eller kupare.

Om det finns nattskatta eller stora besvärliga ogräs kan detta vara ett både bättre och billigare alternativ än att behandla kemiskt, en kombination är också ett alternativ.

Observera dock att kupning bör ske när plantorna är max. 15-20 cm höga. Vid större plantor kan kupning ge skördesänkning.

Preparatval till andra ogräsbekämpningen

Titus har en bred ogräseffekt – men kan behöva blandas med Sencor om målla och åkerbinda fått fler än 3 blad. Titus har ingen effekt på nattskatta. Glöm inte tillsätta vätmedel till Titus då vi i försök har sett radikal effektförsämring utan vätmedel

Alternativ 1: Titus 30-50 g + vätm.

Alternativ 2: Sencor SC 600 0,23 + Titus 30-50 g + vätm. (om åkerbinda och/eller målla fått fler än 3 blad)

Se mer ingående information kring strategier i ogräsbrevet:

<https://www.lyckeby.com/wp-content/uploads/2023/05/ograsrekommendationer-2023.pdf>

Bladmögel

Fynd av bladmögel har gjorts i färskpotatis på Bjäre. Enligt Skimmelstyring har vi just nu ett lågt tryck av bladmögel kopplat till det torra vädret i vårt odlingsområde.

Årets bladmögelbrev med strategier för året kommer i slutet på denna vecka.

Länk till Skimmelstyring:

<https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SkimmelstyringSE.aspx?id=10485>

Bevattning



Prioritera bevattning i de fält som nått **krokstadiet**. Det är nu anlagen till knölarna bildas och välvattnade fält ge större möjlighet till hög knölsättning. Ett av våra bevattningsförsök visar att bevattning vid krokstadiet gynnar knölsättningen men den stora skördepåverkan får man med bevattning under knöltillväxten i juli-augusti månad.


Insektsbevakning

Stritar

Dagens avläsning visar på lågt antal stritar i fällorna i nuläget, med en svag ökning på någon enskild plats.

Bekämpning ska ske en vecka efter inflygningstopp alternativt två veckor efter begynnande inflygning.

Bekämpningsrekommendation: inget bekämpningsbehov denna vecka.



Fältvandringar

Vi planerar att arrangera ett antal fältvandringar i sommar. Mer info om dessa kommer i ett separat utskick inom kort!

Hälsningar
Stefan Hansson
stefan.hansson@lyckeby.com
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Odlarbrev vecka 23

- Aktuellt i fält
- Ogräsbekämpning – uppföljande behandling
- Bladmögel
- Bevattning
- Insektsbevakning
- Fältvandringar

Aktuellt i fält

Det torra och nederbördsfattiga vädret fortsätter och inget regn syns i prognosen framåt heller. Ett starkt högtryck över brittiska öarna ligger och håller emot lågtryck som istället drar in över norra Skandinavien.

Varmt väder gynnar insekterna och vi ser en ökning av inflygningen av stritar på en del platser. Prioritera bevattning i potatisen där plantorna nått krokstadiet.

Ogräsbekämpning – uppföljande behandling

För fält som närmar sig en planhöjd på 15-20 cm så är det dags att utföra en kompletterande ogräsbehandling.

För att få bra effekt av den andra ogräsbekämpningen ska **tidpunkten tajmas efter ogräsens stadium, inte potatisens**. Observera att en del jordherbicer tar tid på sig och att effekter först ses när örtbladen kommer fram.

Ett alternativ är att behandla ogräsen mekaniskt, med radrensare eller kupare.

Om det finns nattskatta eller stora besvärliga ogräs kan detta vara ett både bättre och billigare alternativ än att behandla kemiskt, en kombination är också ett alternativ.

Observera dock att kupning bör ske när plantorna är max. 15-20 cm höga. Vid större plantor kan kupning ge skördesänkning.

Preparatval till andra ogräsbekämpningen

Titus har en bred ogräseffekt – men kan behöva blandas med Sencor om målla och åkerbinda fått fler än 3 blad. Titus har ingen effekt på nattskatta. Glöm inte tillsätta vätmedel till Titus då vi i försök har sett radikal effektförsämring utan vätmedel

Alternativ 1: Titus 30-50 g + vätm.

Alternativ 2: Sencor SC 600 0,23 + Titus 30-50 g + vätm. (om åkerbinda och/eller målla fått fler än 3 blad)

Se mer ingående information kring strategier i ogräsbrevet:

<https://www.lyckeby.com/wp-content/uploads/2023/05/ograsrekommendationer-2023.pdf>

Bladmögel

Fynd av bladmögel har gjorts i färskpotatis på Bjäre. Enligt Skimmelstyring har vi just nu ett lågt tryck av bladmögel kopplat till det torra vädret i vårt odlingsområde.

Årets bladmögelbrev med strategier för året kommer i slutet på denna vecka.

Länk till Skimmelstyring:

<https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SkimmelstyringSE.aspx?id=10485>

Bevattning



Prioritera bevattning i de fält som nått **krokstadiet**. Det är nu anlagen till knölarna bildas och välvattnade fält ge större möjlighet till hög knölsättning. Ett av våra bevattningsförsök visar att bevattning vid krokstadiet gynnar knölsättningen men den stora skördepåverkan får man med bevattning under knöltillväxten i juli-augusti månad.


Insektsbevakning

Stritar

Dagens avläsning visar på lågt antal stritar i fällorna i nuläget, med en svag ökning på någon enskild plats.

Bekämpning ska ske en vecka efter inflygningstopp alternativt två veckor efter begynnande inflygning.

Bekämpningsrekommendation: inget bekämpningsbehov denna vecka.



Fältvandringar

Vi planerar att arrangera ett antal fältvandringar i sommar. Mer info om dessa kommer i ett separat utskick inom kort!

Hälsningar
Stefan Hansson
stefan.hansson@lyckeby.com
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Odlarbrev vecka 23

- Aktuellt i fält
- Ogräsbekämpning – uppföljande behandling
- Bladmögel
- Bevattning
- Insektsbevakning
- Fältvandringar

Aktuellt i fält

Det torra och nederbördsfattiga vädret fortsätter och inget regn syns i prognosen framåt heller. Ett starkt högtryck över brittiska öarna ligger och håller emot lågtryck som istället drar in över norra Skandinavien.

Varmt väder gynnar insekterna och vi ser en ökning av inflygningen av stritar på en del platser. Prioritera bevattning i potatisen där plantorna nått krokstadiet.

Ogräsbekämpning – uppföljande behandling

För fält som närmar sig en planhöjd på 15-20 cm så är det dags att utföra en kompletterande ogräsbehandling.

För att få bra effekt av den andra ogräsbekämpningen ska **tidpunkten tajmas efter ogräsens stadium, inte potatisens**. Observera att en del jordherbicer tar tid på sig och att effekter först ses när örtbladen kommer fram.

Ett alternativ är att behandla ogräsen mekaniskt, med radrensare eller kupare.

Om det finns nattskatta eller stora besvärliga ogräs kan detta vara ett både bättre och billigare alternativ än att behandla kemiskt, en kombination är också ett alternativ.

Observera dock att kupning bör ske när plantorna är max. 15-20 cm höga. Vid större plantor kan kupning ge skördesänkning.

Preparatval till andra ogräsbekämpningen

Titus har en bred ogräseffekt – men kan behöva blandas med Sencor om målla och åkerbinda fått fler än 3 blad. Titus har ingen effekt på nattskatta. Glöm inte tillsätta vätmedel till Titus då vi i försök har sett radikal effektförsämring utan vätmedel

Alternativ 1: Titus 30-50 g + vätm.

Alternativ 2: Sencor SC 600 0,23 + Titus 30-50 g + vätm. (om åkerbinda och/eller målla fått fler än 3 blad)

Se mer ingående information kring strategier i ogräsbrevet:

<https://www.lyckeby.com/wp-content/uploads/2023/05/ograsrekommendationer-2023.pdf>

Bladmögel

Fynd av bladmögel har gjorts i färskpotatis på Bjäre. Enligt Skimmelstyring har vi just nu ett lågt tryck av bladmögel kopplat till det torra vädret i vårt odlingsområde.

Årets bladmögelbrev med strategier för året kommer i slutet på denna vecka.

Länk till Skimmelstyring:

<https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SkimmelstyringSE.aspx?id=10485>

Bevattning



Prioritera bevattning i de fält som nått **krokstadiet**. Det är nu anlagen till knölna bildas och välvattnade fält ge större möjlighet till hög knölsättning. Ett av våra bevattningsförsök visar att bevattning vid krokstadiet gynnar knölsättningen men den stora skördepåverkan får man med bevattning under knöltillväxten i juli-augusti månad.


Insektsbevakning

Stritar

Dagens avläsning visar på lågt antal stritar i fällorna i nuläget, med en svag ökning på någon enskild plats.

Bekämpning ska ske en vecka efter inflygningstopp alternativt två veckor efter begynnande inflygning.

Bekämpningsrekommendation: inget bekämpningsbehov denna vecka.



Fältvandringar

Vi planerar att arrangera ett antal fältvandringar i sommar. Mer info om dessa kommer i ett separat utskick inom kort!

Hälsningar
Stefan Hansson
stefan.hansson@lyckeby.com
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65

Odlarbrev vecka 23

- Aktuellt i fält
- Ogräsbekämpning – uppföljande behandling
- Bladmögel
- Bevattning
- Insektsbevakning
- Fältvandringar

Aktuellt i fält

Det torra och nederbördsfattiga vädret fortsätter och inget regn syns i prognosen framåt heller. Ett starkt högtryck över brittiska öarna ligger och håller emot lågtryck som istället drar in över norra Skandinavien.

Varmt väder gynnar insekterna och vi ser en ökning av inflygningen av stritar på en del platser. Prioritera bevattning i potatisen där plantorna nått krokstadiet.

Ogräsbekämpning – uppföljande behandling

För fält som närmar sig en planhöjd på 15-20 cm så är det dags att utföra en kompletterande ogräsbehandling.

För att få bra effekt av den andra ogräsbekämpningen ska **tidpunkten tajmas efter ogräsens stadium, inte potatisens**. Observera att en del jordherbicer tar tid på sig och att effekter först ses när örtbladen kommer fram.

Ett alternativ är att behandla ogräsen mekaniskt, med radrensare eller kupare.

Om det finns nattskatta eller stora besvärliga ogräs kan detta vara ett både bättre och billigare alternativ än att behandla kemiskt, en kombination är också ett alternativ.

Observera dock att kupning bör ske när plantorna är max. 15-20 cm höga. Vid större plantor kan kupning ge skördesänkning.

Preparatval till andra ogräsbekämpningen

Titus har en bred ogräseffekt – men kan behöva blandas med Sencor om målla och åkerbinda fått fler än 3 blad. Titus har ingen effekt på nattskatta. Glöm inte tillsätta vätmedel till Titus då vi i försök har sett radikal effektförsämring utan vätmedel

Alternativ 1: Titus 30-50 g + vätm.

Alternativ 2: Sencor SC 600 0,23 + Titus 30-50 g + vätm. (om åkerbinda och/eller målla fått fler än 3 blad)

Se mer ingående information kring strategier i ogräsbrevet:

<https://www.lyckeby.com/wp-content/uploads/2023/05/ograsrekommendationer-2023.pdf>

Bladmögel

Fynd av bladmögel har gjorts i färskpotatis på Bjäre. Enligt Skimmelstyring har vi just nu ett lågt tryck av bladmögel kopplat till det torra vädret i vårt odlingsområde.

Årets bladmögelbrev med strategier för året kommer i slutet på denna vecka.

Länk till Skimmelstyring:

<https://web05.agro.au.dk/PotatoLateBlightToolbox/Show/SkimmelstyringSE.aspx?id=10485>

Bevattning



Prioritera bevattning i de fält som nått **krokstadiet**. Det är nu anlagen till knölarna bildas och välvattnade fält ge större möjlighet till hög knölsättning. Ett av våra bevattningsförsök visar att bevattning vid krokstadiet gynnar knölsättningen men den stora skördepåverkan får man med bevattning under knöltillväxten i juli-augusti månad.


Insektsbevakning

Stritar

Dagens avläsning visar på lågt antal stritar i fällorna i nuläget, med en svag ökning på någon enskild plats.

Bekämpning ska ske en vecka efter inflygningstopp alternativt två veckor efter begynnande inflygning.

Bekämpningsrekommendation: inget bekämpningsbehov denna vecka.



Fältvandringar

Vi planerar att arrangera ett antal fältvandringar i sommar. Mer info om dessa kommer i ett separat utskick inom kort!

Hälsningar
Stefan Hansson
stefan.hansson@lyckeby.com
044-28 61 49

Kristoffer Gustafsson
kristoffer.gustafsson@lyckeby.com
044-28 61 65